

RIDX™ FPV Ag Test Kiti

Feline parvovirus (FPV) bağırsakları, bağıışıklık sistemini ve kalbi etkileyen önemli bir kedi virüsüdür. FPV sıklıkla ciddi hastalıklara (örneğin Feline panleukopenia ve Feline infectious enteritis) ve bazen de kedilerin ölümüne neden olur.

RIDX™ FPV Ag Test Kiti, numuneyi damlattıktan sonraki 10 dakika içerisinde kedi dışkısındaki FPV antijenini hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilen bir teşhis reaktifidir.

Prensip: Kalitatif tespit için immunokromatografik test (Yanal Akış Testi)

Numune: Kedi dışkısı

İçerik (10 test/kit)

- FPV Ag test cihazı (10 test)
- Numune seyrelticı tampon (10 tüp)
- Tek kullanımlık sürüntü çubuğu (10 adet)
- Tek kullanımlık damlalık (10 adet)



Özellikler

Klinik Sensitivity %97.4 (76/78) vs. PCR

Klinik Spesifite %98.4 (123/125) vs. PCR

Tespit Limiti $1 \times 10^{5.5}$ TCID₅₀/ml

Kedilerdeki diğer patojenlerle çapraz-reaktivite göstermez. (FIV, FCoV, FeLV)

Test Prosedürü

- 1 Anüsteği ya da dışkının numuneyi toplamak için bir sürüntü çubuğu kullanın.



- 4 Büyük partiküller çokene kadar tüpü bekletin.



- 2 Sürüntü çubuğunu numune seyrelticı tampona yerleştirin ve numuneyi sürüntü çubuğuyla birlikte karıştırın.



- 5 Bir damlalık kullanarak supernatant alın. Cihazdaki numune bölmesine, numune solüsyonundan 4 damla ekleyin.



- 3 Sürüntü çubuğunu numune seyrelticı tampondan çıkarın.



- 6 Sonuçları 10. dakikada okuyun.

